

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*

hypohidrosis ภาวะเหงื่ออ่อน น. การหลั่งเหงื่อลดลง
ผิดปกติ *ค.ม. hypoidrosis*

hypohypnotic -หลับตื้น ว. เกี่ยวกับการหลับไม่ลึก

hypoidrosis ภาวะเหงื่ออ่อน น. ดู *hypohidrosis*

hypoinsulinemia ภาวะเลือดมีอินซูลินน้อย น. การมีอินซูลิน
ในเลือดระดับต่ำผิดปกติ

hypoinsulinism ภาวะอินซูลินน้อย น. การที่ต่อมในตับอ่อน
หลั่งอินซูลินน้อยกว่าปกติ ทำให้เกิดภาวะเลือด
มีน้ำตาลเกิน *ค.ม. insulinopenia*

hypokalemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมน้อย น. การมี
โพแทสเซียมในเลือดระดับต่ำผิดปกติ อาจเกิด
จากการสูญเสียโพแทสเซียมจำนวนมากทางไต
หรือทางเดินอาหาร หรือเกิดจากการได้รับ
โพแทสเซียมน้อย หรือจากการเคลื่อนผ่านเซลล์
เปลี่ยนแปลง ลักษณะเวชกรรมคือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
จนถึงอัมพาต คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ (คลื่นที่ต่ำ
และคลื่นยูสูง) สาเหตุจากโรคไตและโรคทางเดิน
อาหาร *ค.ม. hypokaliemia*

hypokaliemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมน้อย *ค.ม. hypo-*
kalemia

hypokinemia ภาวะพลังส่งเลือดต่ำ น. การที่หัวใจบีบตัว
น้อยกว่าปกติ ทำให้อัตราเลือดไหลเวียนลดลง

hypokinesia ภาวะเคลื่อนไหวน้อย น. การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อและกิจกรรมลดลงผิดปกติ *ค.ม.*
hypanakinesia, hypanakinesis, hypocinesia,
hypokinesis

hypokinesis ภาวะเคลื่อนไหวน้อย น. *ค.ม. hypokinesia*

hypolactasia ภาวะแล็กเทสพร่อง น. การที่เอนไซม์แลคเทส
ในลำไส้ออกฤทธิ์น้อยลง ดู *lactase deficiency*
ประกอบ

hypolarynx ส่วนใต้กล่องเสียง น. ดู *cavitas infraglottica*

hypolemmal -ใต้เยื่อหุ้ม ว. เกี่ยวกับตำแหน่งใต้เยื่อหุ้ม เช่น
ปลายประสาทที่เคลื่อนไหวใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ

hypolipoproteinemia ภาวะเลือดมีโปรตีนไขมันน้อย น.
การมีโปรตีนไขมันในซีรัมระดับต่ำผิดปกติ พบ
ในภาวะเลือดพร่องโปรตีนบีตาไขมัน และโรคทางเจียร์

hypoliposis ภาวะไขมันพร่อง น. การมีไขมันในเลือดหรือ
ที่เนื้อเยื่ออ่อนน้อย ไขมันถูกนำเข้าสู่เลือดในรูปของ
โปรตีนไขมัน

hypolymphemia ภาวะเลือดมีลิมโฟไซต์น้อย น. *ค.ม.*
lymphocytopenia

hypomagnesemia ภาวะเลือดมีแมกนีเซียมน้อย น. การมี
แมกนีเซียมในเลือดน้อยผิดปกติ เกิดจากการดูดซึม
ผิดปกติ ภาวะขาดน้ำ พิษแอลกอฮอล์ หรือ
โรคไต อาการสำคัญคือ ประสาทและกล้ามเนื้อ
แปรปรวน

hypomania ภาวะคลุ้มคลั่ง น. การมีอารมณ์ผิดปกติคล้าย
อาการคลั่ง (อารมณ์รุนแรง กัมมันต์เกิน หลงตัวเอง
 ฯลฯ แต่เป็นไม่มาก)

hypomastia ภาวะนมเล็ก น. ดู *micromastia*

hypomelanosis ภาวะเมลานินน้อย น. การขาดเม็ดสีเมลานิน
ที่ผิวหนัง

* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กันทรกร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.พญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุณนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไชวดี ดุลยจินดา กรรมการ, ดร.ชลธิชา สูดมูข กรรมการ, รศ.ดร.ปรียา ลิฬหกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรื่อน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์เสรีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามี กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โค้ววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินนท์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนานรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ แพรัตน์ กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลหาเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญชญา ไพจิตรหทัย กรรมการและรองเลขานุการ

- idiopathic guttate hypomelanosis ภาวะ
เมลานินน้อยลักษณะไม่ทราบเหตุ น. ผิวหนัง
มีรอยต่างขนาดเล็ก ขอบชัดเกิดครั้งแรกที่แขนขา
ส่วนที่ถูกแสง พบบ่อยในคนอายุมากกว่า ๓๐ ปี
อาการไม่ร้ายแรง ไม่ทราบสาเหตุ
- hypomelanosis of Ito ภาวะเมลานินน้อยฮิโตะ น. กลุ่ม
อาการประสาทร่วมหนึ่งที่เป็นแต่กำเนิด ไม่ปรากฏ
อาการเมื่อแรกคลอด พบในเด็ก ลักษณะสำคัญ
คือผิวหนังจางเป็นวง หรือเป็นเส้น มักพบร่วมกับ
ความผิดปกติอื่น เช่น ผม่วิ่ง และพบความ
ผิดปกติของตา กล้ามเนื้อ กระดูก และสติปัญญา
คมม. *incontinentia pigmenti achromians*
- hypomere ฮัยโพเมียร์ น. ๑. ส่วนข้างด้านล่างของไมโอโทม
เลี้ยงด้วยแขนงหน้าของรากประสาท ๒. ส่วนข้าง
ของมิโซเดิร์ม ที่พัฒนาต่อเป็นผนังโพรงกาย
- hypometabolism ภาวะการแปรรูปอนุบกพร่อง น.
กระบวนการแปรรูปอนุผลิตผิดปกติ อัตราการ
แปรรูปอนุพื้นฐานของร่างกายลดผิดปกติ
- hypomethioninemia ภาวะเลือดมีเมไธโอนีนน้อย น. การ
มีเมไธโอนีนในเลือดลดลง
- hypometria ภาวะเคลื่อนไหวน้ำไม่ถึงเป้า น. การกระษะยผิต
เนื่องจากกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวน้ำสั้นกว่าระยะที่ตั้งใจ
- hypomineralization ภาวะแร่ธาตุพร่อง น. การที่ร่างกาย
ขาดแร่ธาตุ
- hypomyxia ภาวะมุกน้อย น. การหลังมุกลดลง
- hyponasality ภาวะพร่องเสียงนาสิก น. การไม่มีเสียงขึ้น
จมูกและเสียงสะท้อนผ่านจมูก ทำให้เสียงพูดอู้อี้
เหมือนเป็นหวัด คมม. *denasality, rhinolalia
clausa*
- hyponatremia ภาวะเลือดมีโซเดียมน้อย น. การมีโซเดียม
ในเลือดน้อยผิดปกติ
- depletional hyponatremia ภาวะเลือดขาด
โซเดียม น. ดู *euvolemic hyponatremia*
- dilutional hyponatremia ภาวะเลือดมี
โซเดียมน้อยเหตุเจือจาง น. การมีโซเดียมน้อยใน
พลาสมาเนื่องจากสูญเสียโซเดียมออกจาก
ร่างกาย ดังที่พบในกรณีใช้ยาเวโซเพรสซิน หรือ
ปริมาณเลือดน้อย
- euvolemic hyponatremia ภาวะเลือดมี
โซเดียมน้อยปริมาตรปกติ น. การมีโซเดียมใน
พลาสมาน้อย ร่วมกับการขาดโซเดียมปริมาตรเลือด
ปกติ คมม. *depletional hyponatremia*
- hyponeocytosis ภาวะมีเซลล์อ่อนเม็ดเลือดขาวน้อย น.
การที่เลือดมีเม็ดเลือดขาวจำนวนน้อยกว่าปกติ
และมีเซลล์อ่อนในเลือด
- hyponoia ภาวะคิดช้า น. การที่สมองและจิตใจทำงานช้า
- hyponychium ภาวะผิวหนังใต้เล็บหนา น. การมีผิวหนังใต้
ปลายเล็บหนาขึ้น
- hyponychon ภาวะห่อเลือดใต้เล็บ น. การมีเลือดออก
ในผิวหนังใต้เล็บ
- hypoorchidism ภาวะอั้นทะทำงานบกพร่อง น. การที่ต่อม
อั้นทะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนไม่สมบูรณ์
- hypoosmolality ภาวะออสโมแลลิตีต่ำ น. การมี
ออสโมแลลิตีในสารน้ำร่างกายลดลง ปริมาตร
สารน้ำเพิ่มขึ้นและสารตัวละลายลดลง อาการ
เกิดจากเลือดขาดโซเดียม เช่น สมองบวม เกิดอาการ
สับสน อาการผิดปกติเฉพาะที่ และชัก
- hypoovarianism ภาวะรังไข่ทำงานบกพร่อง น. การที่รังไข่
สร้างฮอร์โมนน้อยผิดปกติ
- hypopallesthesia ความรู้สึกสัมผัสเทือนบกพร่อง น.
ความไวของความรู้สึกสัมผัสเทือนลดลงผิดปกติ
- hypopancreatism ภาวะตับอ่อนทำงานบกพร่อง น. การ
ทำงานของตับอ่อนลดลง
- hypoparathyroidism ภาวะพาราไธรอยด์ทำงานบกพร่อง
น. การที่ต่อมพาราไธรอยด์ทำงานลดลงมาก
เป็นผลจากโรคภูมิต้านตนเอง ปัจจัยพันธุกรรม
หรือการตัดต่อมออก การขาดฮอร์โมนพาราไธรอยด์
ทำให้เลือดมีแคลเซียมต่ำ คมม. *parathyroid
insufficiency* ดู *pseudohypo-parathyroidism*
ประกอบ
- hypopepsia ภาวะย่อยอาหารบกพร่อง น. การย่อยอาหาร
ผิดปกติเนื่องจากมีกรดในกระเพาะอาหาร
น้อย
- hypoperfusion การซึมซาบบกพร่อง น. การที่เลือดไปเลี้ยง
อวัยวะลดลง เช่นในภาวะหมดสติเหตุปริมาตร
เลือดน้อย

hypoperistalsis ภาวะบีบรัดบกพร่อง น. การที่ลำไส้บีบรัด
ซ้ำผิดปกติ

hypopexia การตรึงบกพร่อง น. การยึดติดด้วยเนื้อเยื่อที่มี
สารยึดไม่เพียงพอ คมม. hypopexy

hypopexy การตรึงบกพร่อง น. คมม. hypopexia

hypophalangism ภาวะนิ้วไม่ครบ น. การมีนิ้วมือหรือ
นิ้วเท้าน้อยกว่าปกติ

hypopharynx คอหอยส่วนล่าง น. คอหอยส่วนที่เปิดสู่
กล่องเสียงและหลอดอาหาร คมม. pars laryngea
pharyngis

hypophonesis ภาวะเสียงแผ่ว น. การที่ความเข้มของเสียงใน
การฟังตรวจหรือการเคาะตรวจลดลง

hypophonia ภาวะเปล่งเสียงบกพร่อง น. การเปล่งเสียง
ลำบาก เสียงเบาลงจนเป็นเสียงกระซิบ คมม.
leptophonia, microphonia, subenergetic
phonation

hypophoria ภาวะตาเหล่แฝงลง น. รูปแบบหนึ่งของภาวะ
ตาเหล่แฝงที่มีแกนสายตาง้างหนึ่งข้างเบน
ลงล่าง ทำให้การรวมภาพของตา ๒ ข้างถูกขัดขวาง

hypophosphatasia ภาวะฟอสฟาเทสพร่อง
น. การแปรรูปอณูผิดปกติกรรมพันธุ์ รหัส
พันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์แอลคาไลน์
ฟอสฟาเทสกลายพันธุ์ ทำให้ขาดเอนไซม์ใน
ซีรัมและกระดูก เป็นเหตุให้เลือดมีแคลเซียมเกิน
เอทานอลามีนฟอสเฟตในเลือดเกิน และปัสสาวะ
มีเอทานอลามีนฟอสเฟต อาการโรคคล้ายกับ
โรคกรีกเก็ตคือวิตามินดี กะโหลกศีรษะไม่มี
แคลเซียมจับ หายใจลำบาก ตัวเขียว อาเจียน
ท้องผูก แคลเซียมจับในไต เต็บโตซ่า เคลื่อนไหว
ผิดปกติ กระดูกซี่โครงตรงรอยต่อกับกระดูกอ่อน
เป็นปุ่ม ขาโค้ง

hypophosphaturia ภาวะปัสสาวะมีฟอสเฟตน้อย น. การ
มีฟอสเฟตในปัสสาวะน้อยผิดปกติ

hypophrenium อัยโพฟรีเนียม น. ช่องว่างในเยื่อช่องท้อง
ระหว่างกะบังลมและลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง

hypophysectomy การตัดต่อมใต้สมอง น. การตัดออกหรือ
ทำลายต่อมใต้สมอง คมม. pituitectomy

hypophysis ต่อมใต้สมอง น. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ใต้ฐานสมอง
สร้างฮอร์โมนไปควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆ หลายต่อม
คมม. glandular pituitaria, hypophysis cerebri,
pituitary body

hypophysis cerebri ต่อมใต้สมองใหญ่ น.
ดู hypophysis

pharyngeal hypophysis ต่อมใต้สมองส่วน
คอหอย น. เนื้อเยื่อของต่อมใต้สมองที่ค้างอยู่
ในเยื่อเมือกหุ้มกระดูกด้านกลางที่ส่วนบนสุด
ของคอหอยส่วนจมูก พัฒนามาจากถุงรัศเค
(Rathke pouch) ในตัวอ่อน คมม. hypophysis
pharyngealis, pharyngeal pituitary

hypophysis pharyngealis คมม. pharyngeal
hypophysis

hypophysitis ต่อมใต้สมองอักเสบ น. การอักเสบของ
ต่อมใต้สมอง

granulomatous hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบแกรนูโลมา น. โรคต่อมใต้สมองอักเสบ
เรื้อรัง พบไม่บ่อย ลักษณะเฉพาะคือ มีอีสทิโอซัยต์
และเซลล์ยักษ์หลายนิวเคลียสกระจายล้อมรอบ
ด้วยลิมโฟซัยต์และเซลล์พลาสมา อาการที่พบ
คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ ภาวะเลือดมีโปรแล็กตินเกิน อาจพบ
เบาหวานร่วมด้วย

lymphocytic hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบลิมโฟซัยต์ น. การอักเสบของต่อมใต้สมอง
ที่เนื้อต่อมถูกทำลายโดยลิมโฟซัยต์และเซลล์
พลาสมาแทรก ทำให้ต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง
มักพบขณะตั้งครรภ์ คาดว่าเป็นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน
ตนเอง

xanthomatous hypophysitis ต่อมใต้สมอง
อักเสบมีถุงไข่ น. โรคต่อมใต้สมองอักเสบที่พบ
น้อยมาก ลักษณะเฉพาะคือมีถุงสารน้ำไขสีเหลือง
มีอีสทิโอซัยต์ลักษณะฟองในเซลล์และลิมโฟซัยต์
ขนาดเล็กแทรก

hypopigmentation ภาวะสีจาง น. การมีจำนวนเม็ดสี
ลดลงผิดปกติในผิวหนังเกิดจากการสร้างเมลานิน
ลดลง พบในภาวะไร้เมลานินหรือภาวะเมลานินน้อย

postinflammatory hypopigmentation ภาวะสีจางหลังอักเสบ น. การที่สีผิวหนึ่งจางลง หลังหายจากการอักเสบ ติดเชื้อ ไฟลวก หรือ บาดแผล บางครั้งอาจพบหลังการขูดผิวหนัง หรือ ฉีดสเตียรอยด์เข้ารอยโรค

hypopigmenter สารลด น. สารที่ทำให้เม็ดสีผิวหนัง ลดลง เป็นสารฟอกขาว

hypopinealism ภาวะไพบีเนียบกพร่อง น. การที่ต่อมไพบีเนียบ ลดการหลั่งสารฮอร์โมน

hypopituitarism ภาวะต่อมใต้สมองบกพร่อง น. การที่ต่อมใต้สมองกลับหน้าทำงานน้อยลงหรือหยุดทำงานจากต่อมถูกตัด การฉายรังสี หรือหยุดทำงานเอง ดังที่พบในเนื้องอกเซลล์ติดสียาก หรือต่อมตายหลังคลอด (กลุ่มอาการชีฮาน) ทำให้ยากฮอร์โมนหลายชนิด เช่นขาดโซมาโทโทรฟินทำให้เด็กเกิดภาวะแคระ ขาดธัยโรโทรฟินทำให้เกิดภาวะขาดธัยรอยด์ทุติยภูมิ และขาดคอร์ติโคโทรฟินทำให้เกิดโรคต่อมหมวกไตส่วนนอกบกพร่องทุติยภูมิ

hypoplasia ภาวะเจริญด้อย น. การพัฒนาไม่ครบหรือพัฒนาการด้อยของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

cartilage-hair hypoplasia ภาวะกระดูกอ่อนและผมเจริญด้อย น. การที่กระดูกเจริญผิดปกติเกิดจากการกลายพันธุ์ด้อยของหน่วยพันธุกรรมกายที่ควบคุมเอนไซม์เกี่ยวกับการทำงานของไมโทคอนเดรียอาร์เอ็นเอ เกิดภาวะแคระแขนขาสั้น กระดูกซี่โครงด้านข้างบานออก และกระดูกสันนอกนูน ผมบางสีอ่อน นิ้วโทรฟิลน้อยร่วมกับภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์บกพร่อง การดูดซึมอาหารผิดปกติ เป็นโรคซีลีแอค โรคเฮิร์ซสปริง และไวรับการเกิดมะเร็ง

congenital adrenal hypoplasia ภาวะต่อมหมวกไตเจริญด้อยแต่กำเนิด น. ต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานบกพร่องจากโรคถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมเอกซ์ พบในเด็กชาย ลักษณะเพศไม่เจริญตามอายุ มีความผิดปกติของกระดูก อาจพบการถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมกายด้อย

enamel hypoplasia ภาวะเคลือบฟันเจริญด้อย น. รูปแบบหนึ่งของภาวะกำเนิดฟันไม่สมบูรณ์ ลักษณะสำคัญคือ การสร้างเคลือบฟันไม่ครบ อาจเกิดจากการถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมเอกซ์ หรือหน่วยพันธุกรรมกายลักษณะเด่นหรือสาเหตุอื่น [หรือเกี่ยวกับการขาดวิตามินเอ ซี ดี หรือติดเชื้อหัด อีสุกอีใส ใช้สการ์เล็ด ซิฟิลิสแต่กำเนิด (ฟันฮัตชินสัน) ทารกคลอดก่อนกำหนด บาดเจ็บจากการคลอด หมู่เลือดอาร์เอชของแม่ลูกไม่เข้ากัน การได้รับการติดเชื้อเฉพาะที่หรือโรคโมร์ควิโอ ในรายที่อาการน้อย พบร่องเล็กเป็นหลุม หรือรอยแยกบนผิวฟัน ถ้าอาการรุนแรงพบแถวของหลุมลึกเรียงตามแนวราบ หรือไม่มีเคลือบฟัน อาจพบฟันเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แดง หรือน้ำตาล คมม.

hypoplastic emphysema

hypoplastic emphysema ภาวะเคลือบฟันเจริญด้อย น.

คมม. enamel hypoplasia

focal dermal hypoplasia ภาวะหนังเจริญพร่องเฉพาะที่ น. โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมเอกซ์ หน่วยพันธุกรรมนี้ควบคุมการสร้างโปรตีนที่ผ่านเยื่อเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม โรคนี้ถ้าเกิดกับทารกเพศชายจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ถ้าเป็นในทารกเพศหญิงจะมีความผิดปกติของผิวหนัง นิ้ว และตา และอาจพบภาวะสติปัญญาด้อย คมม. *Goltz syndrome*

oligomeganephronic renal hypoplasia ภาวะไตเจริญพร่องชนิดหน่วยไตขนาดใหญ่มีจำนวนน้อย น. ภาวะไตเจริญพร่องแต่กำเนิดที่มีจำนวนกลีบน้อยและหน่วยไตเจริญเกิน คมม. *oligomeganephronia*

hypoplasty ภาวะเจริญพร่อง น. คมม. *hypoplasia*

hypopnea ภาวะหายใจด้อย น. การหายใจสั้นและอัตราการหายใจลดลงผิดปกติ

hypoponesis ภาวะตอบสนองด้อย น. การที่ปฏิกิริยาสนองตอบเพียงน้อยเนื่องจากศักยภาพการทำงานจากสมองใหญ่บริเวณส่วนมอเตอร์และพรีมอเตอร์ไม่เพียงพอ

hypoporosis ภาวะกระดูกข้อมด้อย น. การซ่อมสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์หลังกระดูกหัก

hypoposia ภาวะตึมน้อย น. การตึมสารน้ำลดลงผิดปกติ

hypopotassemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมต่ำ น. *ค.ม. hypokalemia*

hypopotentia ภาวะศักย์ด้อย น. สภาพกำลังลดลง โดยเฉพาะศักย์ไฟฟ้าสมองใหญ่

hypopraxia ภาวะกิจวัตรด้อย น. การประกอบกิจที่ทำเป็นประจำน้อยผิดปกติ

hypoprosody ทำนองเสียงพร่อง น. การออกเสียงด้อยโดยน้ำหนักเสียง ระดับเสียง แต่จังหวะการพูดไม่แปรเปลี่ยน

hypopselaphesia ความรู้สึกสัมผัสน้อย น. *ค.ม. tactile hypoesthesia*

hypoptyalism ภาวะหลังน้ำลายน้อย น. การหลั่งน้ำลายลดลงผิดปกติ พบในภาวะปากแห้ง *ค.ม. hyposalivation, hyposialosis*

hypopyon ภาวะช่องตาส่วนหน้ามีหนอง น. การมีหนองสะสมอยู่ในช่องตาส่วนหน้า

hyporeflexia ภาวะปฏิกิริยาตอบสนองน้อย น. ปฏิกิริยาตอบสนองผิดปกติที่มีรีเฟล็กซ์อ่อนแรง
detrusor hyporeflexia ภาวะปฏิกิริยาตอบสนองด้อยดีทริเซอร์ น. กล้ามเนื้อขับปัสสาวะอ่อนแรงผิดปกติในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น *ดู detrusor areflexia*

hyporeninemia ภาวะเลือดมีเรนินน้อย น. การมีเรนินในเลือดระดับต่ำ

hyposalivation ภาวะหลังน้ำลายน้อย น. *ค.ม. hypoptyalism*

hyposarca ภาวะบวมน้ำ น. *ดู anasarca*

hyposensitization การลดภูมิไว น. *ดู desensitization*

hyposexuality ความต้องการทางเพศน้อย น. การมีความต้องการทางเพศลดลงผิดปกติ

hyposialosis ภาวะหลังน้ำลายน้อย น. *ค.ม. hypoptyalism*

hyposmia ภาวะรับกลิ่นด้อย น. ความไวในการได้กลิ่นลดลง *ค.ม. olfactory hypoesthesia*

hyposomatotropism ภาวะโซมาโทโทรฟินพร่อง น. การมีฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโตน้อย ทำให้เกิดภาวะแคระเหตุต่อมใต้สมองในเด็ก

hyposomia ภาวะแคระ น. ลักษณะที่ร่างกายมีพัฒนาการไม่เพียงพอ *ดู dwarfism* ประกอบ

hyposomnia ภาวะหลับน้อย น. การมีระยะเวลาอนหลับลดลง

hypospadias ท่อปัสสาวะเปิดด้านล่าง น. *ดู hypospadias*

hypospadias ท่อปัสสาวะเปิดด้านล่าง น. ท่อปัสสาวะมีรูเปิดอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าปกติ มีรูเปิดอยู่ด้านล่างของลิ้งค์หรือฝีเย็บ *ค.ม. hypospadias* *ดู female hypospadias* ประกอบ

balanic hypospadias ท่อปัสสาวะเปิด

ใต้ปลายลิ้งค์ น. *ดู glandular hypospadias*

balanitic hypospadias ท่อปัสสาวะเปิด

ใต้ปลายลิ้งค์ น. *ดู glandular hypospadias*

female hypospadias ท่อปัสสาวะเปิด

ด้านล่างในสตรี น. วิชาในหญิง มีรูเปิดของ

ท่อปัสสาวะเข้าในช่องคลอด

glanular hypospadias ท่อปัสสาวะ

เปิดใต้ปลายลิ้งค์ น. รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ที่

ตำแหน่งสายรั้ง ซึ่งอาจมีเพียงร่องรอยหรือ

ไม่ปรากฏ (ตำแหน่งปกติของรูเปิดปัสสาวะควร

อยู่ที่ปลายลิ้งค์) *ค.ม. balanic hypospadias,*

balanitic hypospadias, glanular

hypospadias

glanular hypospadias *ค.ม. glanular*

hypospadias

penile hypospadias ท่อปัสสาวะเปิด

ด้านล่างลำลิ้งค์ น. การมีรูเปิดท่อปัสสาวะอยู่

ที่ลิ้งค์ด้านล่างระหว่างปลายลิ้งค์และรอยต่อ

ระหว่างลิ้งค์กับอวัยวะ

penoscrotal hypospadias ท่อปัสสาวะ

เปิดด้านล่างรอยต่อลิ้งค์กับอวัยวะ น. การมีรูเปิด

ท่อปัสสาวะอยู่ด้านล่างที่ตำแหน่งต่อระหว่างลิ้งค์

กับอวัยวะ บางครั้งพบในรายที่ลิ้งค์อแต่กำเนิด

perineal hypospadias ท่อปัสสาวะ

เปิดที่ฝีเย็บ น. การมีรูเปิดท่อปัสสาวะเปิด

ด้านล่างอวัยวะเพศที่มีเพียงร่องรอยของลิ้งค์ใน

รูปแบบเรียกว่า *pseudovaginal hypospadias*

pseudovaginal hypospadias ภาวะท่อปัสสาวะเปิดด้านล่างช่องคลอดเท็จ น. ดูคำอธิบาย *perineal hypospadias*

hyposplenism ภาวะม้ามบกพร่อง น. การที่ม้ามทำงานลดลง

hypostasis ภาวะเลือดคั่งส่วนล่าง น. การไหลเวียนของเลือดในร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนไม่ดี หรือไม่ไหลเวียนดังที่พบในภาวะเลือดดำไม่ไหลเวียน

hyposthenuria ภาวะปัสสาวะเข้มข้นน้อย น. การที่ไตไม่สามารถทำให้ปัสสาวะมีออสโมแลลิตีสูง

tubular hyposthenuria ภาวะปัสสาวะเข้มข้นน้อยเหตุหลอดไตฝอย น. การที่ไตไม่สามารถทำให้ปัสสาวะมีออสโมแลลิตีสูง เนื่องจากเซลล์บุผิวของหลอดไตฝอยบาดเจ็บ

hypostome โครงสร้างเกี่ยวกับปาก น. ส่วนโครงสร้างหรืออวัยวะที่เกี่ยวกับปาก

hypostomia ภาวะปากเล็ก น. ภาวะที่เกิดจากการพัฒนา ลักษณะสำคัญคือ ปากเล็กผิดปกติ ช่องเปิดแนวตั้ง

hypostosis ภาวะกระดูกเจริญตัวย น. กระดูกพัฒนาน้อยกว่าปกติ

hyposynergia ภาวะพร่องการประสาน น. ดู *dyssynergia*

hypotelorism ภาวะอยู่ชิดเกิน น. การที่ระยะระหว่างอวัยวะ ๒ ชิ้นหรือ ๒ ส่วน อยู่ใกล้กันผิดปกติ

ocular hypotelorism ภาวะลูกตาชิดเกิน น. การที่ระยะระหว่างตา ๒ ข้าง อยู่ชิดกัน ผิดปกติ พบในภาวะหัวสามเหลี่ยม

orbital hypotelorism ภาวะเบ้าตาชิดเกิน น. ดู *ocular hypotelorism*

hypotension ๑. ภาวะความดันเลือดต่ำ น. การมีแรงดันเลือดต่ำผิดปกติ พบในภาวะช็อก

๒. ภาวะความดันต่ำ น. การที่สารน้ำคั่งรูปมีความตึงตัวหรือแรงดันต่ำผิดปกติ

chronic idiopathic orthostatic hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเมื่อร่างกายตั้งตรงไม่ทราบเหตุเรื้อรัง น. ร่างกายหลายระบบฝ่อลีบ อาการเริ่มแรกคือ ระบบอิสระทำงานไม่เพียงพอ มีแรงดันเลือดต่ำ ไร้อสมรรถภาพทางเพศในชาย ท้องผูก กลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะค้างในกระเพาะ ไม่มีเหงื่อ ต่อมา ประสาทไม่ทำงานทั่วกาย มีอาการพาร์คินสัน สมอมน้อยทำงานไม่ประสาน กล้ามเนื้อเสื่อมและสั่น ขาสั่น *คัมม. Shy-Drager syndrome*

chronic orthostatic hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเมื่อร่างกายตั้งตรงเรื้อรัง น. ดู *chronic idiopathic orthostatic hypotension*

idiopathic orthostatic hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเมื่อร่างกายตั้งตรงไม่ทราบเหตุ น. ดู *chronic idiopathic orthostatic hypotension*

intracranial hypotension ภาวะความดันในกะโหลกต่ำ น. การมีแรงดันในกะโหลกศีรษะต่ำผิดปกติ เกิดในกรณีน้ำหล่อสมองไขสันหลังรั่วหลังเจาะสันหลัง

intradialytic hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำขณะฟอกเลือด น. การมีความดันเลือดต่ำบางเวลา เป็นภาวะแทรกซ้อนในการฟอกเลือดทดแทนไต

orthostatic hypotension ภาวะแรงดันเลือดต่ำเมื่อตั้งกายตรง น. การมีความดันเลือดลดลงร่วมกับอาการวิงเวียน ตามัว อาจร่วมกับเป็นลม เกิดเมื่อยืนขึ้นหรือเมื่อยืน เป็นชั่วคราวหรือเรื้อรัง หรือเป็นเหตุจากภาวะระบบประสาทกลางผิดปกติ พบในกลุ่มอาการชาย-ดราเกอร์ *คัมม. postural hypotension*

postural hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ น. ดู *orthostatic hypotension*

supine hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเมื่อนอนหงาย น. การที่ความดันเลือดลดลงเมื่ออยู่ในท่านอนหงาย เนื่องจากหลอดเลือดดำใหญ่และท่อเลือดแดงส่วนลง ถูกกดบางส่วนโดยมดลูก พบในหญิงมีครรภ์ แก้ไขได้โดยให้นอนตะแคง *คัมม. supine hypotension syndrome, supine hypotensive syndrome, vena caval syndrome*

vascular hypotension ภาวะความดันเลือดต่ำเหตุหลอดเลือด น. การมีความดันเลือดต่ำรุนแรงเกิดจากหลอดเลือดขยายตัว

Shy-Drager syndrome กลุ่มอาการชาย-ดราเกอร์ น. ดู *chronic idiopathic orthostatic hypotension*

hypotensor สารลดแรงดันเลือด น. สารที่ออกฤทธิ์ลดแรงดันเลือด

hypothalamotomy การผ่าฮัยโปธาลามัส น. การผ่าตัดฮัยโปธาลามัส เป็นวิธีบำบัดรักษาโรคจิต

hypothalamus ฮัยโปธาลามัส น. โดเอนเซฟาลอนส่วนพื้นและด้านข้างของโพรงสมองที่สาม ประกอบด้วยบริเวณหน้าประสาทตา ลำเส้นใยประสาทตา ส่วนไขว้ประสาทตา เทห์มิลลารีทูเบอร์ซินเนอเรียม กรวย และนิวโรฮัยโปไฟซีส

hypothermia ภาวะอุณหภูมิต่ำ น. ๑. การลดอุณหภูมิแกนของร่างกายให้อยู่ที่ ๓๕ องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า เกิดจากอุณหภูมิของภาวะแวดล้อมหรือการทำให้อุณหภูมิลดลง

๒. ภาวะอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาอวัยวะที่ตัดจากร่างกายรอเวลาปลูกถ่าย *คัมม. hypothermy*
accidental hypothermia ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำอุบัติเหตุ น. การลดอุณหภูมิร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น เกิดจากภาวะแวดล้อม ไม่รบกวนศูนย์กลางการควบคุมอุณหภูมิ

endogenous hypothermia ภาวะอุณหภูมิต่ำเหตุในกาย น. การที่อุณหภูมิกายลดลงผิดปกติ เกิดจากการทำงานของระบบประสาทกลางส่วนโดเอนเซฟาลอนบกพร่อง หรือเกิดจากระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมไธรอยด์

environmental hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำเหตุสภาพแวดล้อม น. ภาวะอุณหภูมิกายต่ำที่เกิดจากการเสียความร้อนทางการสะท้อน การซักน้ำ การแผ่รังสีออกจากร่างกายไปสู่อากาศโดยรอบ

induced hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำกระทำ น. การลดอุณหภูมิร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้การแปรรูปของเนื้อเยื่อและความต้องการออกซิเจนลดลง บางครั้งใช้ร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดแขนขา และเป็นวิธีการปกป้องอวัยวะในการผ่าตัดหัวใจและระบบประสาท

mild hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำเล็กน้อย น. การลดอุณหภูมิกายให้อยู่ระหว่าง ๓๓ ถึง ๓๕ องศาเซลเซียส

moderate hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำปานกลาง น. การลดอุณหภูมิกายให้อยู่ระหว่าง ๒๘ ถึง ๓๓ องศาเซลเซียส

regional hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำเฉพาะส่วน น. การลดอุณหภูมิเฉพาะแขนขาหรือบางอวัยวะ โดยการบริหารความเย็นจากภายนอกหรือหล่อเลี้ยงด้วยน้ำยาอุณหภูมิกายเย็นจัด

severe hypothermia ภาวะอุณหภูมิกายต่ำรุนแรง น. การลดอุณหภูมิกายให้อยู่ระหว่าง ๙ ถึง ๒๘ องศาเซลเซียส

hypothermy ภาวะอุณหภูมิต่ำ น. *ดู hypothermia*

hypothrombinemia ภาวะเลือดมีรอมบินน้อย น. การที่เลือดขาดสารรอมบิน

hypothyria ภาวะแล้งอารมณ์ น. การมีอารมณ์ผิดปกติตั้งในภาวะซึมเศร้า

hypothyrmism ภาวะต่อมไธมัสบกพร่อง น. การที่ต่อมไธมัสทำงานลดลงผิดปกติ

hypothyroidism ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่อง น. การที่ต่อมไธรอยด์ทำหน้าที่น้อยลงผิดปกติ ลักษณะสำคัญคือ อัตราการแปรรูปอนุลดลง อ่อนเพลียและไม่มีแรง ดำเนินเข้าสู่ภาวะขาดฮอร์โมนไธรอยด์ในผู้ใหญ่ พบในหญิงมากกว่าชาย ในทารกทำให้เกิดโรคแคระงอ *คัมม. athyria, athyroidism, athyroidosis, hypothyrosis, thyroid insufficiency, thyroprivia*

central hypothyroidism ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่องส่วนกลาง น. *ดู secondary hypothyroidism*

consumptive hypothyroidism ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่องเหตุถูกใช้ น. ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่องเนื่องจากมีเนื้ออกหลุดเลือดในตับ ทำให้ปลดปล่อยไอโอดีนออกจากฮอร์โมนไธรอยด์ซิน มักพบในทารก พบได้บ้างในผู้สูงอายุ

hypothalamic hypothyroidism ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่องเหตุฮัยโปธาลามัส น. ภาวะต่อมไธรอยด์บกพร่องทุติยภูมิ เกิดจากฮัยโปธาลามัสที่มีการขัดขวางการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นไธรอยด์ *คัมม. tertiary hypothyroidism*

infantile hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องวัยทารก น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ที่พบตั้งแต่วัยทารก ทำให้เกิดภาวะแคระงอ

juvenile hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องวัยตรุณ น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ในวัยเด็ก อาการอยู่ระหว่างอาการที่พบในทารกกับในผู้ใหญ่ ถ้าเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า ๓ ปี จะเกิดอาการสติปัญญาต่ำ

juvenile acquired hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องวัยตรุณภายหลัง น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ที่มีอาการตั้งแต่เด็ก แต่เริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไป เหตุจากขาดฮอร์โมนกระตุ้นธัยรอยด์ พบลักษณะเต็บโตซัวและหยุดโต ผิวหนังหนาสีเหลือง ผิวหน้าหยาบ พัฒนาการทางเพศช้า เมื่อโตเต็มที่มีร่างกายเตี้ย

pituitary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องเหตุต่อมใต้สมอง น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง มักเกิดจากเนื้องอก ทำให้ขาดการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์

primary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องปฐมภูมิ น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์เนื่องจากโรคของต่อมธัยรอยด์เอง มักพบฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ระดับสูงขึ้น

secondary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องทุติยภูมิ น. การขาดฮอร์โมนธัยรอยด์ เนื่องจากการหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์จากต่อมใต้สมองไม่เพียงพอ *ค.ม. central hypothyroidism*

tertiary hypothyroidism ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่องตติยภูมิ น. *ดู hypothalamic hypothyroidism*

hypothyrosis โรคต่อมธัยรอยด์บกพร่อง น. *ดู hypothyroidism*

hypotonia ภาวะตึงตัวน้อย น. การที่กล้ามเนื้อโครงร่างตึงตัวน้อยอ่อนปวกเปียก ส่วนมากเกิดจากประสาทที่มาเลี้ยงผิดปกติ *ค.ม. hypotonus*

benign congenital hypotonia ภาวะตึงตัวน้อยแต่กำเนิดไม่ร้าย น. การที่ทารกมีกล้ามเนื้อโครงร่างอ่อนแรงปวกเปียกตั้งแต่คลอด อาการอ่อนแรงและโง่งง

hypotonia oculi ภาวะลูกตาดึงตัวน้อย น. การมีแรงดันในลูกตาดำ

hypotonicity สภาพตึงตัวน้อย น. การมีกล้ามเนื้อหย่อน

hypotonus ภาวะตึงตัวน้อย น. *ดู hypotonia*

hypotoxicity สภาพพิษน้อย น. การที่ความเป็นพิษลดลงหรือบรรเทา

hypotrichiasis ภาวะขนน้อย ๑. ภาวะหัวล้านแต่กำเนิด น. *ดู congenital alopecia* ๒. ภาวะผมน้อย น. *ดู hypotrichosis*

hypotrichosis ภาวะขนน้อย น. การมีผมหรือขนน้อยกว่าปกติ *ค.ม. hypotrichiasis*

Marie Unna hypotrichosis ภาวะหัวล้านมารีอันนา น. การที่เด็กเกิดมามีผมน้อย ผมขดเป็นวงและกลายเป็นหัวล้าน เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมลักษณะเด่นซึ่งตรงกับโรคพันธุกรรมที่ทำให้หนูไร้ขน พบไม่บ่อย *ค.ม. hereditary trichodysplasia*

hereditary trichodysplasia ภาวะขนพัฒนาผิดปกติกรรมพันธุ์ น. *ค.ม. Marie Unna hypotrichosis*

hypotrophy ภาวะเจริญพร่อง น. *ค.ม. abirotrophy*

hypotropia ภาวะตาเหล่ลง น. ตาเหล่ที่มีแกนสายตาช้างหนึ่งเบี่ยงเบนลงถาวร

hypotympanotomy การผ่าเปิดหูส่วนกลาง น. การผ่าตัดเพื่อเปิดช่องหูส่วนกลาง

hypotympanum ช่องใต้หูส่วนกลาง น. ช่องว่างในหูส่วนกลางใต้ขอบล่างของซัลคัสทิมพานิคัส ของกระดูกขมับ

hypouremia ภาวะเลือดพร่องยูเรีย น. การมีสารยูเรียในเลือดน้อยกว่าระดับปกติ

hypouresis การถ่ายปัสสาวะน้อย น. การสร้างและขับปัสสาวะลดลงกว่าที่ได้รับสารน้ำเข้าสู่ร่างกาย โดยมีปริมาณน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตร ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง *ค.ม. oliguria*

oliguria ภาวะปัสสาวะน้อย น. *ค.ม. hypouresis*

hypouricemia ภาวะเลือดพร่องกรดยูริก น. การขาดกรดยูริกในเลือด พบร่วมกับปัสสาวะมีแชนทิน เกิดจากการขาดเอนไซม์แชนทินออกซิเดส ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนฮัยโปแชนทินเป็นแชนทิน และเปลี่ยนแชนทินเป็นกรดยูริก

hypouricosuria ภาวะปัสสาวะพร่องกรดยูริก น. การมีกรดยูริกน้อยกว่าปกติในปัสสาวะ *ค.ม. hypouricuria*

hypouricuria ดู *hypouricosuria*

hypovarianism ภาวะรังไข่บกพร่อง น. การที่รังไข่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนน้อยผิดปกติ *คम्म. hypo-ovarianism*

hypovenosity สภาพพร่องหลอดเลือดดำ น. การที่ระบบหลอดเลือดดำพัฒนาไม่สมบูรณ์ในบางบริเวณ

hypoovarianism ภาวะรังไข่บกพร่อง น. *คम्म. hypoovarianism*

hypoventilation การระบายอากาศลดลง น. การที่ปริมาณอากาศที่หายใจเข้าถูกลดลงในปอดลดลง เป็นผลให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น

controlled hypoventilation การระบายอากาศลดลงในภาวะควบคุม น. ดู *permissive hypercapnia*

primary alveolar hypoventilation การระบายอากาศถุงลมปอดลดลงปฐมภูมิ น. การควบคุมการหายใจอัตโนมัติผิดปกติ เกิดจากรอยโรคที่ไขสันหลังหรือก้านสมอง ซึ่งควบคุมโดยตั้งใจ จะหยุดหายใจขณะหลับ *คम्म. Ondine curse*

Ondine curse คำสาปออนติน น. ดู *primary alveolar hypoventilation*

hypovitaminosis โรควิตามินพร่อง น. การขาดวิตามินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

hypovolemia ภาวะปริมาตรเลือดน้อย น. การที่ปริมาตรเลือดหมุนเวียนในร่างกายลดลงผิดปกติ สาเหตุเกิดจากการตกเลือด

hypovolia ภาวะสารน้ำน้อย น. ส่วนประกอบที่เป็นสารน้ำลดลงหรือปริมาตรลด เกิดกับสารน้ำนอกเซลล์

hypoxemia ภาวะเลือดพร่องออกซิเจน น. การที่เลือดมีออกซิเจนน้อยกว่าปกติ

hypoxia ภาวะออกซิเจนพร่อง น. การมีออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อน้อยกว่าระดับสรีรภาพ แม้ว่าเลือดไปหล่อเลี้ยงเพียงพอ

anemic hypoxia ภาวะออกซิเจนพร่องเหตุเลือดจาง น. การที่ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลงเนื่องจากขาดเลือดที่เป็นตัวนำออกซิเจน เป็นผลจากการที่เลือดมีฮีโมโกลบินต่ำลงหรือมีฮีโมโกลบินผิดปกติ

affinity hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนสัมพรรคภาพ น. การที่ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลงเนื่องจากฮีโมโกลบินไม่ปล่อยออกซิเจนให้เนื้อเยื่อ

circulatory hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุการไหลเวียนเลือดหยุด น. ดู *stagnant hypoxia*

fetal hypoxia ภาวะทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน น. การที่ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนจากการทำหน้าที่ของรกผิดปกติ มักเกิดจากรกลอกตัว ภาวะครรภ์เป็นพิษ สายสะดือย้อย หรือเป็นผลแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก

histotoxic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุเนื้อเยื่อถูกพิษ น. การขาดออกซิเจนเนื่องจากเนื้อเยื่อไม่สามารถใช้ออกซิเจน

hypobaric hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุความกดอากาศต่ำ น. ภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดในสภาพแวดล้อมที่มีความกดอากาศต่ำ ดังที่พบในการมาเครื่องบิน การมาความสูง

hypoxemic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุออกซิเจนในเลือดน้อย น. ภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดจากออกซิเจนที่จับกับเลือดไม่เพียงพอ

hypoxic hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุออกซิเจนเข้าเลือดน้อย น. ดู *hypoxemic hypoxia*

stagnant hypoxia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุเลือดหยุดหมุนเวียน น. ภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดจากขาดเลือดไหลเวียน

hypoxia-ischemia ภาวะขาดออกซิเจนเหตุเนื้อเยื่อขาดเลือด น. การเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยง ดังที่พบในทารกในครรภ์หรือเด็กเล็กที่ขาดอากาศหายใจ

hypoxidosis โรคออกซิเจนพร่อง น. การทำหน้าที่ของเซลล์เสียไปเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงลดลง

hypsarrhythmia คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ หวระ น. การมีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ พบในทารก คลื่นโวลเทจสูงขึ้นช้าแบบสุ่ม และคลื่นโค้งแหลม เกิดจากจุดโฟกัสหลายตำแหน่งและกระจายทั่วบริเวณสมองส่วนนอก พบได้บ่อยในรายที่มีอาการชักสะตุ้ง (jackknife seizure)

hypsiccephaly หัวหลิม น. การมีศีรษะด้านบนสูงชันหรือเป็นรูปกรวย เนื่องจากการปิดเร็วก่อนกำหนดของรอยประสานক্র่อมขม่อมหน้า และรอยประสานท้ายทอยคम्म. *acrocephaly, oxycephaly, steeple head, steeple skull, tower head, towel skull, turriccephaly*

hypsisaphylia เพดานปากแคบและโค้งสูง น. การมีเพดานปากแคบและโค้งสูงผิดปกติ

hypsochinesis การเดินโย้หลัง น. ท่าเดินโย้และเซไปข้างหลังหรือล้มเมื่อยืนตรง พบในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน โรควิลสัน และโรคอื่นในกลุ่มเดียวกัน

hysteratresia ภาวะมดลูกด้อยเจริญ น. การมีช่องเปิดมดลูกตีบตัน

hysterectomy การตัดมดลูก น. ศัลยกรรมตัดมดลูกทั้งหมด
abdominal hysterectomy การตัดมดลูกผ่านหน้าท้อง น. ศัลยกรรมตัดมดลูกผ่านผนังหน้าท้อง
cesarean hysterectomy การผ่าท้องทำคลอดและตัดมดลูก น. การตัดมดลูกออกตามหลังการผ่าท้องทำคลอด

complete hysterectomy การตัดมดลูกทั้งหมด น. ดู *total hysterectomy*

laparoscopically assisted vaginal hysterectomy การตัดมดลูกผ่านช่องคลอดอาศัยกล้อง น. การตัดมดลูกออกทางช่องคลอดโดยใช้เครื่องมือผ่านหน้าท้องตัดเอ็นโยงยึดของมดลูก

partial hysterectomy การตัดมดลูกบางส่วน น. ดู *subtotal hysterectomy*

radical hysterectomy การตัดมดลูกถอนรากถอนโคน น. การตัดมดลูกทั้งหมดร่วมกับสิ่งที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานออกจนหมด ถ้าผ่าตัดผ่านช่องคลอดเรียกว่า Schauta operation คम्म. *Wertheim operation*

subtotal hysterectomy การตัดมดลูกเกือบหมด น. การตัดมดลูกเหลือคอมดลูกไว้ในตำแหน่งปกติไม่ตัดออก คम्म. *supracervical hysterectomy, supravaginal hysterectomy*

supracervical hysterectomy การตัดมดลูกเหนือคอมดลูก น. ดู *subtotal hysterectomy*

supravaginal hysterectomy การตัดมดลูกเหนือช่องคลอด น. ดู *subtotal hysterectomy*

total hysterectomy การตัดมดลูกหมด น. การตัดมดลูกรวมทั้งคอมดลูกออกทั้งหมด คम्म. *panhysterectomy*

vaginal hysterectomy การตัดมดลูกทางช่องคลอด น. การตัดมดลูกผ่านผนังช่องคลอด

panhysterectomy การตัดมดลูกออกหมด น. ดู *total hysterectomy*

hysterocolpectomy การตัดมดลูกและช่องคลอด น. การตัดมดลูกและช่องคลอดออกหมด

hysterogram ภาพรังสีมดลูก น. ภาพถ่ายมดลูกทางรังสี

hystero-graphy ๑. การบันทึกลายเส้นแรงบีบตัวมดลูก น. การบันทึกแรงบีบตัวของมดลูกขณะคลอด
๒. การถ่ายภาพรังสีมดลูก

น. การถ่ายภาพรังสีของมดลูกหลังฉีดสารทึบแสง คำว่า คम्म. *metrography, uterography*

hysterolysis การเลาะมดลูก น. การผ่าตัดคลายมดลูกออกจากพังผืดที่ยึดติด

hysteromyomectomy การตัดเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก น. ดู *uterine myomectomy*

hysteromyotomy การผ่ามดลูก น. การผ่ากรีดเปิดมดลูก

hysteropathy โรคมดลูก น. การมีมดลูกผิดปกติหรือเป็นโรค

hysteropexy การตรึงมดลูก น. ศัลยกรรมตรึงมดลูกที่อยู่ผิดตำแหน่ง อาจเย็บตรึงกับผนังหน้าท้องหรือตัดเอ็นกลมโยงยึด หรือทำให้เอ็นโยงยึดมดลูกด้านหลังสั้นลง หรือทำให้พังผืดในอุ้งเชิงกรานสั้นลง อาจเป็นการยึดมดลูกกับผนังหน้าท้องหรือผนังช่องคลอด คम्म. *hysterorrhathy ๑*

hysteroptosis ภาวะมดลูกหย่อน น. การที่มดลูกเคลื่อนลงล่างมาก ทำให้ปากมดลูกลงมาอยู่ภายในช่องคลอด หรือยื่นออกจากรูเปิดหรือทั้งหมด คम्म. *descensus uteri, prolapsed of uterus, uterine prolapse*

hysterorrhaphy ๑. การตรึงมดลูก น. ดู *hysteropexy*
 ๒. การซ่อมมดลูก น. การเย็บซ่อมแผลฉีกขาดของมดลูก

hysterorrhexis มดลูกแตก น. การที่มดลูกแยกตัวออกจากกัน *คम्म. metrorrhexis*

hysterosalpingectomy การตัดมดลูกและท่อนำไข่ น. การผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้าง

hysterosalpingography การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ น. การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ภายหลังฉีดสารทึบแสง *คम्म. uterosalpingography*

uterosalpingography การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ น. ดู *hysterosalpingography*

hysterosalpingo-oophorectomy การตัดมดลูกและปีกมดลูก น. การผ่าตัดมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ทั้งสองข้าง

hysterosalpingostomy การตัดต่อมดลูกกับท่อนำไข่ น. การผ่าตัดเพื่อเชื่อมประสานมดลูกกับท่อนำไข่หลังจากตัดส่วนท่อตีตันออกไป

hysteroscope กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก น. กล้องส่องตรวจภายในโพรงมดลูก

hysteroscopy การส่องตรวจโพรงมดลูก น. การตรวจโพรงมดลูกด้วยกล้อง

hysterospasm มดลูกหดเกร็ง น. การที่กล้ามเนื้อมดลูกบีบเกร็ง

hysterotomy การผ่าเปิดมดลูก น. การกรีดเปิดมดลูกเพื่อนำทารกออก

abdominal hysterotomy การผ่าเปิดมดลูกทางหน้าท้อง น. การกรีดผนังหน้าท้องเปิดมดลูก *คम्म. abdomino hysterotomy, adbominouterotomy, laparohysterotomy*

vaginal hysterotomy การผ่าเปิดมดลูกทางช่องคลอด น. การกรีดเปิดมดลูกผ่านทางช่องคลอด